

| 科   | 分類    | レジメン名称                                  | 1クール<br>日数 | 注意コメント                                                                                                                                                                       |
|-----|-------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 皮膚科 | 悪性黒色腫 | 《悪性黒色腫》DAV(DTIC/ACNU/VCR)【アプレピタント】〈耳・3〉 | 21         | 【アプレピタント】125mg(day1),80mg(day2-5),<br>DTIC:80-140mg/m <sup>2</sup> (day1-5),ACNU:50-80mg/m <sup>2</sup> (day1),VCR:0.5-0.8mg/m <sup>2</sup> (Max2mg/body)(day1),<br>1クール:21日 |
| 皮膚科 | 乾癬    | 《乾癬》レミケート <sup>®</sup> 10mg/kg(8週ごと継続)  | 56         | レミケート <sup>®</sup> :max10mg/kg(day1),<br>初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎,<br>1クール:56日,<br>*6週まで:5mg/kg,効果不十分:10mg/kgまで増量or4週まで短縮(6mg/kg)                             |
| 皮膚科 | 乾癬    | 《乾癬》レミケート <sup>®</sup> 5mg/kg(8週ごと継続)   | 56         | レミケート <sup>®</sup> :5mg/kg(day1),<br>初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎,<br>1クール:56日                                                                                    |
| 皮膚科 | 乾癬    | 《乾癬》レミケート <sup>®</sup> 5mg/kg(初回・2週・6週) | 98         | レミケート <sup>®</sup> :5mg/kg(day1,15,43),<br>初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎,<br>1クール:98日                                                                              |
| 皮膚科 | 乾癬    | 《乾癬》レミケート <sup>®</sup> 6mg/kg(4週ごと継続)   | 28         | レミケート <sup>®</sup> :6mg/kg(day1),<br>初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎,<br>1クール:28日,<br>*6週まで:5mg/kg,効果不十分:10mg/kgまで増量or4週まで短縮(6mg/kg)                                 |
| 皮膚科 | 天疱瘡   | 《天疱瘡》RIT                                | 14         | 【アセトアミノフェン】500mg1T(day1),【レスタミン】10mg5T(day1),<br>RIT希釈用生食量=リツキサン投与量(mg)/10×9,10倍希釈,<br>RIT:1000mg/body(day1),<br>1クール:14日,*2回まで,再発時再投与可                                      |