

| 科    | 分類          | レジメン名称                                                  | 1クール<br>日数 | 注意コメント                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 形成外科 | MSI-High固形癌 | 《MSI-High固形癌》(3週<br>毎)Pembrolizumab200mg/body           | 21         | infusion reaction G2:投与中止,1hr以内に回復の場合,投与速度50%減速して再開,<br>infusion reaction経験例は次回より前投薬投与(レスタミン50mg,アセトアミノフェン500-1000mg),<br>Pembrolizumab:200mg/body(day1),<br>1クール:21日                             |
| 形成外科 | MSI-High固形癌 | 《MSI-High固形癌》(6週<br>毎)Pembrolizumab400mg/body           | 42         | infusion reaction G2:投与中止,1hr以内に回復の場合,投与速度50%減速して再開,<br>infusion reaction経験例は次回より前投薬投与(レスタミン50mg,アセトアミノフェン500-1000mg),<br>Pembrolizumab:400mg/body(day1),<br>1クール:42日                             |
| 形成外科 | 悪性黒色腫       | 《悪性黒色腫》(2週<br>毎)Nivolumab240mg/body                     | 14         | infusion reactionを認めた場合,次回より前投薬としてアセトアミノフェンやジフェンヒドラムシンの追加を考慮する,<br>体重30kg未満の場合,生食の希釈液を50mLに変更する,<br>術後補助療法の場合は投与期間は12ヶ月間まで,<br>Nivolumab:240mg/body(day1),<br>1クール:14日                            |
| 形成外科 | 悪性黒色腫       | 《悪性黒色腫》(4週<br>毎)Nivolumab480mg/body                     | 28         | infusion reactionを認めた場合,次回より前投薬としてアセトアミノフェンやジフェンヒドラムシンの追加を考慮する,<br>体重30kg未満の場合,生食の希釈液100mLから50mLを抜いて対応すること,<br>Nivolumab:480mg/body(day1),<br>1クール:28日                                            |
| 形成外科 | 悪性黒色腫       | 《悪性黒色腫》<br>DAV(DTIC/ACNU/VCR)【アプレ<br>ピタント】(耳・3)         | 21         | 【アプレピタント】125mg(day1),80mg(day2-5),<br>タカルバジン:80-140mg/m <sup>2</sup> (day1-5),ニトラン:50-80mg/m <sup>2</sup> (day1),<br>オンコビン:0.5-0.8mg/m <sup>2</sup> (最大1回量2mg)(day1),<br>1クール:21日                 |
| 形成外科 | 悪性黒色腫       | 《悪性黒色腫》Ipilimumab                                       | 21         | infusion reactionを認めた場合,次回より前投薬としてアセトアミノフェン又はNSAIDsの追加考慮,<br>レジメン適応体重30-120kg以外の場合はIpilimumabの希釈濃度に注意。(1-4mg/ml(参考;欧米5mg/mlまで))<br>Ipilimumab:3mg/kg(day1),<br>1クール:21日                           |
| 形成外科 | 悪性黒色腫       | 《悪性黒色腫》<br>Ipilimumab+Nivolumab80mg/body                | 21         | infusion reactionを認めた場合,次回より前投薬としてアセトアミノフェン又はNSAIDsの追加考慮,<br>レジメン適応体重30-120kg以外の場合はIpilimumabの希釈濃度に注意(1-4mg/ml(参考;欧米5mg/mlまで)),<br>Ipilimumab:3mg/kg(day1),Nivolumab:80mg/body(day1),<br>1クール:21日 |
| 形成外科 | 頭頸部扁平上皮癌    | 《頭頸部扁平上皮》☆<br>FP+Cet(Cetのみ)(耳・23)                       | 7          | 5FU:700mg/m <sup>2</sup> (day1-5),CDDP:70mg/m <sup>2</sup> (day1),Cet:初回400mg/m <sup>2</sup> ,2回目以降250mg/m <sup>2</sup> (day1.8.15),<br>1クール:21日                                                  |
| 形成外科 | 頭頸部扁平上皮癌    | 《頭頸部扁平上皮》<br>FP(5FU/CDDP)+Cet【アロリス】<br>(継続)day1のみ(耳・23) | 21         | 5FU:700mg/m <sup>2</sup> (day1-5),CDDP:70mg/m <sup>2</sup> (day1),Cet:初回400mg/m <sup>2</sup> ,2回目以降250mg/m <sup>2</sup> (day1.8.15),<br>1クール:21日                                                  |
| 形成外科 | 頭頸部扁平上皮癌    | 《頭頸部扁平上皮》<br>FP(5FU/CDDP)+Cet【アロリス】<br>(初回)day1のみ(耳・23) | 21         | 5FU:700mg/m <sup>2</sup> (day1-5),CDDP:70mg/m <sup>2</sup> (day1),Cet:初回400mg/m <sup>2</sup> ,2回目以降250mg/m <sup>2</sup> (day1.8.15),<br>1クール:21日                                                  |
| 形成外科 | 頭頸部扁平上皮癌    | 《頭頸部扁平上皮癌》<br>CDDP+RT【アロリス】(耳11-19)                     | 21         | 【アロリス】、【テカドロン】8mg(day4),(day5適宜)<br>CDDP:80mg/m <sup>2</sup> (MAX100mg/m <sup>2</sup> )(day1),<br>1クール:21日                                                                                        |
| 形成外科 | 頭頸部扁平上皮癌    | 《頭頸部扁平上皮癌》Cet(継<br>続)(外・309)                            | 7          | Cet:初回400mg/m <sup>2</sup> ,2回目以降250mg/m <sup>2</sup> (day1),<br>1クール:7日                                                                                                                          |

|      |          |                          |   |                                                                          |
|------|----------|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 形成外科 | 頭頸部扁平上皮癌 | 《頭頸部扁平上皮癌》Cet(初回)〈外・309〉 | 7 | Cet:初回400mg/m <sup>2</sup> ,2回目以降250mg/m <sup>2</sup> (day1),<br>1クール:7日 |
|------|----------|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|