

科	分類	レジメン名称	1クール 日数	注意コメント
小児科	IBD炎症性腸疾患	《クローン病》レミケート [®] 10mg/kg(8週ごと継続)	56	レミケート [®] :10mg/kg(day1), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎, 体重20kg未満の場合,生食の希釈液を50mLに変更する, 体重40kgを超える場合,生食の希釈液を250mLに変更する, 【希釈濃度範囲:0.4~4mg/mL】,1クール:56日, *6週まで:5mg/kg,効果減弱時:10mg/kgまで増量or4週まで短縮可
小児科	IBD炎症性腸疾患	《クローン病》レミケート [®] 5mg/kg(4週ごと継続)	28	レミケート [®] :5mg/kg(day1), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎, 体重25kg未満の場合,生食の希釈液を50mLに変更する, 体重80kgを超える場合,生食の希釈液を250mLに変更する, 【希釈濃度範囲:0.4~4mg/mL】,1クール:28日, *6週まで:5mg/kg,効果減弱時:10mg/kgまで増量or4週まで短縮可
小児科	IBD炎症性腸疾患	《クローン病》レミケート [®] 5mg/kg(8週ごと継続)	56	レミケート [®] :5mg/kg(day1), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎, 体重25kg未満の場合,生食の希釈液を50mLに変更する, 体重80kgを超える場合,生食の希釈液を250mLに変更する, 【希釈濃度範囲:0.4~4mg/mL】,1クール:56日
小児科	IBD炎症性腸疾患	《クローン病》レミケート [®] 5mg/kg(8週ごと継続)(患者限定)<消内・701>	56	レミケート [®] :5mg/kg(day1), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎, 1クール:56日
小児科	IBD炎症性腸疾患	《クローン病》レミケート [®] 5mg/kg(初回・2週・6週)	98	レミケート [®] :5mg/kg(day1,15,43), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎, 体重25kg未満の場合,生食の希釈液を50mLに変更する, 体重80kgを超える場合,生食の希釈液を250mLに変更する, 【希釈濃度範囲:0.4~4mg/mL】,1クール:98日
小児科	IBD炎症性腸疾患	《潰瘍性大腸炎》エンタビオ [®] (8週ごと継続)(患者限定)【適応:16歳以上】	56	【適応:16歳以上】, エンタビオ [®] :300mg/body(day1), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎, 1クール:56日
小児科	IBD炎症性腸疾患	《潰瘍性大腸炎》エンタビオ [®] (初回・2週・6週)(患者限定)【適応:16歳以上】	98	【適応:16歳以上】, エンタビオ [®] :300mg/body(day1,15,43), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎, 1クール:98日