

科	レジメン名称	1クール日数	最大回数	注意コメント	確認コメント *院内向けのコメントを含んでいます
形成外科	《MSI-High固形癌》 Pembrolizumab	21	—	infusion reaction G2:投与中止,1hr以内に回復の場合,投与速度50%減速して再開,☑ infusion reaction経験例は次回より前投薬投与(レスタミン50mg,アセトアミノフェン500-1000mg),☑ Pembrolizumab:200mg/body(day1),☑ 1クール:21日	・がん化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-Highを有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る)☑ ・infusion reaction(Grade2):Pembrolizumabの投与を直ちに中止する,1時間以内に回復する場合には投与速度を50%減速して再開☑ ・infusion reaction経験例では次回より投与前1.5時間(±30分)に以下薬剤で前処置を行う☑ レスタミン50mg,アセトアミノフェン500-1000mg経口投与
形成外科	《悪性黒色腫》 Ipilimumab+Nivolumab80mg/body	21	—	"infusion reactionを認めた場合,次回より前投薬としてアセトアミノフェン又はNSAIDsの追加考慮, レジメン適応体重30~120kg以外の場合はIpilimumabの希釈濃度に注意(1~4mg/ml(参考;欧米5mg/mlまで)), Ipilimumab:3mg/kg(day1),Nivolumab:80mg/body(day1), 1クール:21日"	infusion reactionを認めた場合,次回より前投薬としてアセトアミノフェン又はNSAIDsの追加考慮
形成外科	《悪性黒色腫》Ipilimumab	21	—	infusion reactionを認めた場合,次回より前投薬としてアセトアミノフェン又はNSAIDsの追加考慮,☑ Ipilimumab:3mg/kg(day1),☑ 1クール:21日	infusion reactionを認めた場合,次回より前投薬としてアセトアミノフェン又はNSAIDsの追加考慮
形成外科	《悪性黒色腫》 Nivolumab240mg/body	14	—	infusion reactionを認めた場合,次回より前投薬としてアセトアミノフェンやジフェンドラミンの追加を考慮する,☑ 体重30kg未満の場合,生食の希釈液を50mLに変更する,☑ 術後補助療法の場合は投与期間は12ヶ月間まで,☑ Nivolumab:240mg/body(day1),☑ 1クール:14日	infusion reactionを認めた場合,次回より前投薬としてアセトアミノフェンやジフェンドラミンの追加考慮☑ 体重30kg未満の場合,生食の希釈液を50mLに変更☑ 術後補助療法の場合は投与期間は12ヶ月間まで
形成外科	《悪性黒色腫》 DAV(DTIC/ACNU/VCR)【イメド】 (耳・3)	21	—		【イメド】125mg(day1),80mg(day2-5),☑ ダカルバジン:80-140mg/m <sup>2</sup> (day1-5),ドクタラン:50-80mg/m <sup>2</sup> (day1),☑ オコピリン:0.5-0.8mg/m <sup>2</sup> (最大1回量2mg)(day1),☑ 1クール:21日
形成外科	《頭頸部扁平上皮癌》Cet(継続) (外・309)	7	—	"Cet:初回400mg/m <sup>2</sup> ,2回目以降250mg/m <sup>2</sup> (day1), 1クール:7日"	「Mg値」等の血液検査を実施すること
形成外科	《頭頸部扁平上皮癌》Cet(初回) (外・309)	7	—	"Cet:初回400mg/m <sup>2</sup> ,2回目以降250mg/m <sup>2</sup> (day1), 1クール:7日"	「Mg値」等の血液検査を実施すること
形成外科	《頭頸部扁平上皮》☆FP+Cet(Cetのみ)(耳・23)	7	—	5FU:700mg/m <sup>2</sup> (day1-5),CDDP:70mg/m <sup>2</sup> (day1),Cet:初回400mg/m <sup>2</sup> ,2回目以降250mg/m <sup>2</sup> (day1.8.15),☑ 1クール:21日	"Cetのみ day1は「FP+Cet」を適用 「Mg値」等の血液検査を実施すること"
形成外科	《頭頸部扁平上皮》 FP(5FU/CDDP)+Cet【7日イメド】 (継続)day1のみ(耳・23)	21	—	5FU:700mg/m <sup>2</sup> (day1-5),CDDP:70mg/m <sup>2</sup> (day1),Cet:初回400mg/m <sup>2</sup> ,2回目以降250mg/m <sup>2</sup> (day1.8.15),☑ 1クール:21日	day8.15は別レジメンを適用☑ 「Mg値」等の血液検査を実施すること
形成外科	《頭頸部扁平上皮》 FP(5FU/CDDP)+Cet【7日イメド】 (初回)day1のみ(耳・23)	21	—	5FU:700mg/m <sup>2</sup> (day1-5),CDDP:70mg/m <sup>2</sup> (day1),Cet:初回400mg/m <sup>2</sup> ,2回目以降250mg/m <sup>2</sup> (day1.8.15),☑ 1クール:21日	day8.15は別レジメンを適用☑ 「Mg値」等の血液検査を実施すること