

科	分類	レジメン名称	1クール日数	注意コメント
免疫リウマチ科	膠原病：RIT	《膠原病》RIT(BSA1.5未満)	7	【アセトアミノフェン】500mg1T(day1),【レスタミン】10mg5T(day1), RIT:375mg/㎡(day1), 1クール:7日,*4回まで
免疫リウマチ科	膠原病：RIT	《膠原病》RIT(BSA1.5以上)	7	【アセトアミノフェン】500mg1T(day1),【レスタミン】10mg5T(day1), RIT:375mg/㎡(day1), 1クール:7日,*4回まで
免疫リウマチ科	膠原病：CPA	《膠原病・SLE》CPA(入院)	28	CPA:750mg/㎡(day1), 1クール:28日
免疫リウマチ科	膠原病：CPA	《膠原病・SLE》CPA(外来)	28	CPA:750mg/㎡(day1), 1クール:28日
免疫リウマチ科	膠原病	《膠原病・SLE》ヘンリスタ(初回・2週・4週)(患者限定)	56	ヘンリスタ:10mg/kg(day1.15.29), 1クール:56日, 初回(day1),2週(day15),4週(day29),以後4週(28日)毎
免疫リウマチ科	膠原病	《膠原病・SLE》サフネロー(患者限定)	28	サフネロー:300mg/body(day1),1クール:28日
免疫リウマチ科	膠原病	《膠原病・SLE》ヘンリスタ(4週ごと継続)(患者限定)	28	ヘンリスタ:10mg/kg(day1), 1クール:28日, 初回(day1),2週(day15),4週(day29),以後4週(28日)毎
免疫リウマチ科	成人スチル病	《成人スチル病》アクテムラ	14	アクテムラ:8mg/kg(day1), 1クール:14日 ※症状により1週間まで投与間隔を短縮できる
免疫リウマチ科	血小板減少性紫斑症	《ITP》RIT(BSA1.5未満)	7	【アセトアミノフェン】500mg1T(day1),【レスタミン】10mg5T(day1), RIT:375mg/㎡(day1),PSL:50mg/body(day1), 1クール:7日,*4回まで
免疫リウマチ科	血小板減少性紫斑症	《ITP》RIT(BSA1.5以上)	7	【アセトアミノフェン】500mg1T(day1),【レスタミン】10mg5T(day1), RIT:375mg/㎡(day1),PSL:50mg/body(day1), 1クール:7日,*4回まで
免疫リウマチ科	強直性脊椎炎	《強直性脊椎炎》ミケート(初回・2週・6週)	84	ミケート:5mg/kg(day1.15.43), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後6-8週(42-56日)毎, 1クール:98日
免疫リウマチ科	強直性脊椎炎	《強直性脊椎炎》ミケート(6週ごと継続)	42	ミケート:5mg/kg(day1), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後6-8週(42-56日)毎, 1クール:42日
免疫リウマチ科	関節リウマチ	《関節リウマチ》ミケート(初回・2週・6週)	98	ミケート:3mg/kg(day1.15.43), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎, 1クール:98日
免疫リウマチ科	関節リウマチ	《関節リウマチ》インフリキシマフBS(8週ごと継続)	56	インフリキシマフBS:max10mg/kg(day1), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎, 1クール:56日, *6週まで:3mg/kg,効果不十分:10mg/kgまで増量or4週まで短縮(6mg/kg)
免疫リウマチ科	関節リウマチ	《関節リウマチ》インフリキシマフBS(初回・2週・6週)	98	インフリキシマフBS:3mg/kg(day1.15.43), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎, 1クール:98日
免疫リウマチ科	関節リウマチ	《関節リウマチ》インフリキシマフBS(4週ごと継続)	28	インフリキシマフBS:6mg/kg(day1), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎, 1クール:28日, *6週まで:3mg/kg,効果不十分:10mg/kgまで増量or4週まで短縮(6mg/kg)
免疫リウマチ科	関節リウマチ	《関節リウマチ》オレンシア(初回・2週・4週)60kg未満	56	オレンシア:500mg/body(day1.15.29), 初回(day1),2週(day15),4週(day29),以後4週(28日)毎, 1クール:56日
免疫リウマチ科	関節リウマチ	《関節リウマチ》オレンシア(初回・2週・4週)60kg以上100kg以下	56	オレンシア:750mg/body(day1.15.29), 初回(day1),2週(day15),4週(day29),以後4週(28日)毎, 1クール:56日
免疫リウマチ科	関節リウマチ	《関節リウマチ》オレンシア(初回・2週・4週)100kg超	56	オレンシア:1000mg/body(day1.15.29), 初回(day1),2週(day15),4週(day29),以後4週(28日)毎, 1クール:56日
免疫リウマチ科	関節リウマチ	《関節リウマチ》オレンシア(4週ごと継続)60kg未満	28	オレンシア:500mg/body(day1), 初回(day1),2週(day15),4週(day29),以後4週(28日)毎, 1クール:28日
免疫リウマチ科	関節リウマチ	《関節リウマチ》オレンシア(4週ごと継続)60kg以上100kg以下	28	オレンシア:750mg/body(day1.15.29), 初回(day1),2週(day15),4週(day29),以後4週(28日)毎, 1クール:56日
免疫リウマチ科	関節リウマチ	《関節リウマチ》オレンシア(4週ごと継続)100kg超	28	オレンシア:1000mg/body(day1.15.29), 初回(day1),2週(day15),4週(day29),以後4週(28日)毎, 1クール:56日
免疫リウマチ科	関節リウマチ	《関節リウマチ》アクテムラ	21	アクテムラ:8mg/kg(day1), 1クール:21日
免疫リウマチ科	関節リウマチ	《関節リウマチ》ミケート(8週ごと継続)	56	ミケート:max10mg/kg(day1), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎, 1クール:56日, *6週まで:3mg/kg,効果不十分:10mg/kgまで増量or4週まで短縮(6mg/kg)
免疫リウマチ科	関節リウマチ	《関節リウマチ》ミケート(4週ごと継続)	28	ミケート:6mg/kg(day1), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎, 1クール:28日, *6週まで:3mg/kg,効果不十分:10mg/kgまで増量or4週まで短縮(6mg/kg)
免疫リウマチ科	間質性肺炎	《間質性肺炎》CPAハルス(ELNT・外来)(免・07)	14	CPA:500mg/body(day1), 1クール:14日
免疫リウマチ科	間質性肺炎	《間質性肺炎》CPAハルス(ELNT・入院)(免・08)	14	CPA:500mg/body(day1), 1クール:14日
免疫リウマチ科	ループス腎炎	《ループス腎炎》CPAハルス(ELNT・外来)	14	CPA:500mg/body(day1), 1クール:14日
免疫リウマチ科	ループス腎炎	《ループス腎炎》CPAハルス(ELNT・入院)	14	CPA:500mg/body(day1), 1クール:14日
免疫リウマチ科	ヘーチェット病	《ヘーチェット病》ミケート(初回・2週・6週)	98	ミケート:5mg/kg(day1.15.43), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎, 1クール:98日
免疫リウマチ科	ヘーチェット病	《ヘーチェット病》ミケート(8週ごと継続)	56	ミケート:max10mg/kg(day1), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎, 1クール:56日 *6週まで:5mg/kg,効果不十分:10mg/kgまで増量
免疫リウマチ科	ANCA関連血管炎	《ANCA関連血管炎》RIT(BSA1.5未満)(免・06)	7	【アセトアミノフェン】500mg1T(day1),【レスタミン】10mg5T(day1), RIT:375mg/㎡(day1),PSL:50mg/body(day1), 1クール:7日,*4回まで
免疫リウマチ科	ANCA関連血管炎	《ANCA関連血管炎》RIT(BSA1.5以上)(免・06)	7	【アセトアミノフェン】500mg1T(day1),【レスタミン】10mg5T(day1), RIT:375mg/㎡(day1),PSL:50mg/body(day1), 1クール:7日,*4回まで
免疫リウマチ科	ANCA関連血管炎	《ANCA関連血管炎》CPA(60歳以上70歳未満)(入院)	14	60歳未満:CPA:15mg/kg(day1), 60歳以上70歳未満:CPA:12.5mg/kg(day1), 70歳以上:CPA:10mg/kg(day1), 年齢別レジメンあり, 血清Cr:3.4~5.7mg/dLでは2.5mg/kgずつ減量, 1クール:14日

免疫リウマチ科	ANCA関連血管炎	《ANCA関連血管炎》CPA(60歳未満)(入院)	14	60歳未満:CPA:15mg/kg(day1), 60歳以上70歳未満:CPA:12.5mg/kg(day1), 70歳以上:CPA:10mg/kg(day1), 年齢別レジメンあり, 血清Cr:3.4～5.7mg/dLでは2.5mg/kgずつ減量, 1クール:14日
免疫リウマチ科	ANCA関連血管炎	《ANCA関連血管炎》CPA(60歳未満)(外来)	14	60歳未満:CPA:15mg/kg(day1), 60歳以上70歳未満:CPA:12.5mg/kg(day1), 70歳以上:CPA:10mg/kg(day1), 年齢別レジメンあり, 血清Cr:3.4～5.7mg/dLでは2.5mg/kgずつ減量, 1クール:14日
免疫リウマチ科	ANCA関連血管炎	《ANCA関連血管炎》CPA(70歳以上)(入院)	14	60歳未満:CPA:15mg/kg(day1), 60歳以上70歳未満:CPA:12.5mg/kg(day1), 70歳以上:CPA:10mg/kg(day1), 年齢別レジメンあり, 血清Cr:3.4～5.7mg/dLでは2.5mg/kgずつ減量, 1クール:14日
免疫リウマチ科	ANCA関連血管炎	《ANCA関連血管炎》CPA(60歳以上70歳未満)(外来)	14	60歳未満:CPA:15mg/kg(day1), 60歳以上70歳未満:CPA:12.5mg/kg(day1), 70歳以上:CPA:10mg/kg(day1), 年齢別レジメンあり, 血清Cr:3.4～5.7mg/dLでは2.5mg/kgずつ減量, 1クール:14日
免疫リウマチ科	ANCA関連血管炎	《ANCA関連血管炎》CPA(70歳以上)(外来)	14	60歳未満:CPA:15mg/kg(day1), 60歳以上70歳未満:CPA:12.5mg/kg(day1), 70歳以上:CPA:10mg/kg(day1), 年齢別レジメンあり, 血清Cr:3.4～5.7mg/dLでは2.5mg/kgずつ減量, 1クール:14日