

科	レジメン名称	1クール日数	最大回数	注意コメント	確認コメント *院内向けのコメントを含んでいます
脳神経外科	《MSI-High固形癌》 Pembrolizumab	21	—	infusion reaction G2:投与中止,1hr以内に回復の場合,投与速度50%減速して再開,☑ infusion reaction経験例は次回より前投薬投与(レスタミン50mg,アト7ミ/フェン500-1000mg),☑ Pembrolizumab:200mg/body(day1),☑ 1クール:21日	・がん化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-Highを有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る) ☑ ・infusion reaction(Grade2):Pembrolizumabの投与を直ちに中止する,1時間以内に回復する場合には投与速度を50%減速して再開☑ ・infusion reaction経験例では次回より投与前1.5時間(±30分)に以下薬剤で前処置を行う☑ レスタミン50mg,アト7ミ/フェン500-1000mg経口投与
脳神経外科	《ジヤミノマ》 ICE(IFM/CDDP/ETP)【イマド】(患者限定)	28	—	【イマド】 125mg(day1),80mg(day2-5),☑ CDDP:20mg/m ² (day1-5),IFM:900mg/m ² (day1-5),ETP:60mg/m ² (day1-5),☑ 1クール:28日	【要処方】イマド
脳神経外科	《悪性神経膠腫》初 発:TMZ(p.o.)+Bv(15mg/kg)(Bv単剤療法期)	21	—	Bv:15mg/kg(day1),☑ 1クール:21日,☑ *(RT併用期)→(TMZ維持療法期)→【Bv単剤療法期】	Bv:「尿蛋白測定」必要☑ 【Bv単剤療法期】
脳神経外科	《悪性神経膠腫》初 発:TMZ(p.o.)+Bv(10mg/kg)(TMZ維持療法期)	28	—	TMZ(p.o.):150(-200)mg/m ² /day(day1-5),Bv:10mg/kg(day1,15),☑ 1クール:28日,☑ *(RT併用期)→【TMZ維持療法期】→(Bv単剤療法期)	【要処方】TMZ(p.o.)☑ 【TMZ維持療法期】☑ Bv:「尿蛋白測定」必要
脳神経外科	《悪性神経膠腫》初 発:TMZ(p.o.)+Bv(RT併用期)	42	—	TMZ(p.o.):75mg/m ² /day(day1-42),Bv:10mg/kg(day1,15,29),☑ 1クール:42日,☑ *【RT併用期】→(TMZ維持療法期)→(Bv単剤療法期)	【要処方】TMZ(p.o.)☑ 【RT併用期】☑ Bv:「尿蛋白測定」必要
脳神経外科	《悪性神経膠腫》再 発:TMZ200mg/m ² (増量)	28	—	TMZ:200mg/m ² (day1-5),☑ 1クール:28日,☑ *再発,2回目以降	再発(増量)200mg/m ²
脳神経外科	《悪性神経膠腫》再 発:TMZ150mg/m ² (初回)	28	—	TMZ:150mg/m ² (day1-5),☑ 1クール:28日,☑ *再発,初回,2回目以降増量可(別レジメン)	再発(初回)150mg/m ²
脳神経外科	《悪性神経膠腫》初 発:TMZ200mg/m ² (増量)	28	—	TMZ:200mg/m ² (day1-5),☑ 1クール:28日,☑ *初発,2回目以降	初発(増量)200mg/m ²
脳神経外科	《悪性神経膠腫》初 発:TMZ150mg/m ² (初回)	28	—	TMZ:150mg/m ² (day1-5),☑ 1クール:28日,☑ *初発,初回,2回目以降増量可(別レジメン)	初発(初回)150mg/m ²
脳神経外科	《悪性神経膠腫》初 発:TMZ75mg/m ² (7日分)(RT併用期)	7	—	TMZ:75mg/m ² (RT中:day1-42),☑ 1クール:70日,☑ *初発,RT併用	初発(RT併用)75mg/m ² ☑ 7日分×6週(6回)適用必要☑ 42日間(6週)投与→28日間(4週)休薬
脳神経外科	《ジヤミノマ》 CARE(CBDCA/ETP)	21	—	CBDCA:450mg/m ² (day1),ETP:150mg/m ² (day1-3),☑ 1クール:21日	
脳神経外科	《髄芽腫》 (研)IT(CPA/ETP/CDDP/VCR/MTX)	28	—	【デロイマド】 , 【デカトロン】 8mg(day8適宜),☑ CPA:1.5g/m ² (day1,3,5),ETP:100mg/m ² (day1-5),CDDP:90mg/m ² (day5),VCR:1.5mg/m ² (Max2mg/body)(day1),MTX(髄注):12mg/body(day3),カミチキチカ:CPAの40%量(day1,3,5),☑ 1クール:28日	【処方検討】デカトロン☑ カミチキチカは患者限定☑ VCR(カネコ)は,MAX2mg/body
脳神経外科	《悪性神経膠腫》再 発:Bv(10mg/kg)	14	—	Bv:10mg/kg(day1),☑ 1クール:14日	Bv:「尿蛋白測定」必要