

【内服薬】

◎児 C：急性気管支炎・気管支喘息の鎮咳・去痰

組成	基本単位
アスベリンシロップ 0.5%	8.0mL
アンブロキシール塩酸塩シロップ 0.3%	6.0mL
単シロップ	4.0mL
全量	18.0mL

調製方法：それぞれを量りとり、ボトル内で転倒混和する。

参考量：6歳標準量 18mL/day

◎児 D：鎮咳・去痰

組成	基本単位
カルボシステインシロップ 5%	10.0mL
プロカテロール塩酸塩シロップ 0.0005%	10.0mL
単シロップ	2.0mL
全量	24.0mL

調製方法：それぞれを量りとり、ボトル内で転倒混和する。

参考量：6歳標準量 24mL/day

【外用薬】

◎十塩吸：鼻吸入（1包 5g を水 500mL に溶解して使用する）

	基本単位
炭酸水素ナトリウム（局方）	2.5g
塩化ナトリウム（局方）	2.5g
全量	5.0g

調製方法：炭酸水素ナトリウム及び塩化ナトリウムを秤量する。

1包あたり 5.0g となるように分包する。

◎含嗽薬

組成	基本単位
蒸留水	500mL
局方グリセリン	60mL (適宜増減あり)
全量	560mL

調製方法：蒸留水 500mL あたり局方グリセリン 60mL を混和する。

用法：医師の指示通りに適宜うがい用にする。

※AZ 含嗽用細粒、アズノールうがい液、キシロカイン外用液が併せて処方されることがあり。