

科	レジメン名称	1クール日数	最大回数	注意コメント	確認コメント	*院内向けのコメントを含んでいます
歯科口腔外科	《頭頸部癌》 PTX+CBDCA+Cet(継続)	21	-	CBDCA(mg/body)=AUC(mg/ml/min)×(GFR+25),Calvert:GFR=Ccrと仮定,☑ PTX:100mg/m ² (day1.8),CBDCA:AUC2.5(day1.8),Cet:初回400mg/m ² ,2回目を以降250mg/m ² (day1.8.15),☑ 1ヶ-7日	「Mg値」等の血液検査を実施すること☑ 《カボプラチン最大投与量》AUC2.5 375mg/body	
歯科口腔外科	《頭頸部癌》 PTX+CBDCA+Cet(初回)	21	-	CBDCA(mg/body)=AUC(mg/ml/min)×(GFR+25),Calvert:GFR=Ccrと仮定,☑ PTX:100mg/m ² (day1.8),CBDCA:AUC2.5(day1.8),Cet:初回400mg/m ² ,2回目を以降250mg/m ² (day1.8.15),☑ 1ヶ-7日	「Mg値」等の血液検査を実施すること☑ 《カボプラチン最大投与量》AUC2.5 375mg/body	
歯科口腔外科	《頭頸部扁平上皮癌》 CBDCA+RT (耳・11)	7	-	CBDCA:75mg/m ² (day1),☑ 1ヶ-7日		
歯科口腔外科	《頭頸部癌》 Nivolumab240mg/body	14	-	infusion reactionを認めた場合,次回より前投薬としてアト7ミノフィレンドリンの追加を考慮 する,☑ 体重30kg未満の場合,生食の希釈液を50mLに変更する,☑ Nivolumab:240mg/body(day1),☑ 1ヶ-14日	infusion reactionを認めた場合,次回より前投薬としてアト7ミノフィレンドリンの追加を考慮 ☑ 体重30kg未満の場合,生食の希釈液を50mLに変更	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》 CDDP超選択的動注(耳・ 18)【閉鎖式器具使用不可】	7	-	【イマド】125mg(day1),80mg(day2.3),【デカドロン】8mg(day2.3),☑ メロ: CDDP10mgに対して1mL,デトキ: CDDPと同時に9A,終了後に6hrで9A,☑ RT併用又は単独,2ヶ-目は1W後以降(RT中に3,4回),リド:カイン:血管痛・スパスム予防,リソ:血管保 護目的,☑ CDDP:100mg/m ² (day1),☑ 1ヶ-7日	【要処方】イマド,デカドロン	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》☆ FP+Cet(Cetのみ)(耳・23)	7	-	CDDP:70mg/m ² (day1),5FU:700mg/m ² (day1-5),Cet:初回400mg/m ² ,2回目を以降250mg/ m ² (day1.8.15.22)☑ 1ヶ-7日	Cetのみ☑ day1は「FP+Cet」を適用☑ 「Mg値」等の血液検査を実施すること	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》新 FP(5FU/CDDP)+Cet【7日 イマド】(継続)day1のみ	21	-	【7日イマド】☑ CDDP:70mg/m ² (day1),5FU:700mg/m ² (day1-5),Cet:初回400mg/m ² ,2回目を以降250mg/m ² (day1.8.15.22),☑ 1ヶ-21日	day8,15,22のCetのみは,別レジメンを適用☑ 「Mg値」等の血液検査を実施すること	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》新 FP(5FU/CDDP)+Cet【7日 イマド】(初回)day1のみ	21	-	【7日イマド】☑ CDDP:70mg/m ² (day1),5FU:700mg/m ² (day1-5),Cet:初回400mg/m ² ,2回目を以降250mg/m ² (day1.8.15.22),☑ 1ヶ-21日	day8,15,22のCetのみは,別レジメンを適用☑ 「Mg値」等の血液検査を実施すること	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》 wPTX+Cet(Cetのみ)(耳・ 24)	7	-	Cet:初回400mg/m ² ,2回目を以降250mg/m ² (day1.8.15.22.29.36.43.50),☑ PTX:80mg/m ² (day1.8.15.22.29.36),☑ 1ヶ-56日☑ *day43.50:wPTX+Cet(Cetのみ)を適用	Cetのみ☑ 「Mg値」等の血液検査を実施すること	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》 wPTX+Cet(継続)(耳・24)	7	-	Cet:初回400mg/m ² ,2回目を以降250mg/m ² (day1.8.15.22.29.36.43.50),☑ PTX:80mg/m ² (day1.8.15.22.29.36),☑ 1ヶ-56日☑ *day43.50:wPTX+Cet(Cetのみ)を適用	「Mg値」等の血液検査を実施すること	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》 wPTX+Cet(初回)(耳・24)	7	-	Cet:初回400mg/m ² ,2回目を以降250mg/m ² (day1.8.15.22.29.36.43.50),☑ PTX:80mg/m ² (day1.8.15.22.29.36),☑ 1ヶ-56日☑ *day43.50:wPTX+Cet(Cetのみ)を適用	「Mg値」等の血液検査を実施すること	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》 wDOC+Cet(初回)(耳・22)	28	-	【イスタミン】10mg5T(day1),*経口不能時:ラミン1A,☑ DOC:20mg/m ² (day1.8.15),Cet:初回400mg/m ² ,2回目を以降250mg/m ² (day1.8.15.22),☑ 1ヶ-28日	【要処方】イスタミン☑ 「Mg値」等の血液検査を実施すること	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》 wDOC+Cet(継続)(耳・22)	28	-	【イスタミン】10mg5T(day1),*経口不能時:ラミン1A,☑ DOC:20mg/m ² (day1.8.15),Cet:初回400mg/m ² ,2回目を以降250mg/m ² (day1.8.15.22),☑ 1ヶ-28日	【要処方】イスタミン☑ 「Mg値」等の血液検査を実施すること	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》 Cet(継続)(外・309)	7	-	【イスタミン】10mg5T(day1),*経口不能時:ラミン1A,☑ デキ:初回6.6mg,2回目を以降3.3mg,☑ Cet:初回400mg/m ² ,2回目を以降250mg/m ² ,☑ 1ヶ-7日	【要処方】イスタミン☑ 化学療法またはRTと必ず併用のこと☑ 「Mg値」等の血液検査を実施すること	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》 Cet(初回)(外・309)	7	-	【イスタミン】10mg5T(day1),*経口不能時:ラミン1A,☑ デキ:初回6.6mg,2回目を以降3.3mg,☑ Cet:初回400mg/m ² ,2回目を以降250mg/m ² ,☑ 1ヶ-7日	【要処方】イスタミン☑ 化学療法またはRTと必ず併用のこと☑ 「Mg値」等の血液検査を実施すること	
歯科口腔外科	《悪性黒色腫》 DAV(DTIC/ACNU/VCR)【イ マド】(形・2)	21	-	【イマド】125mg(day1),80mg(day2-5),☑ DTIC:80-140mg/m ² (day1-5),ACNU:50-80mg/m ² (day1),VCR:0.5-0.8mg/m ² (Max2mg/body)(day1),☑ 1ヶ-21日	【要処方】イマド	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》 CF(CDDP/5FU)+RT【7日 イマド】(耳・9)	21	-	【7日イマド】 day0Hydration, CDDP:40mg/m ² (day1),5FU:400mg/m ² (day1-5), 1ヶ-21日	【要処方】day0にHydration	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》新 CDDP+RT【7日イマド】	21	-	CDDP:80-100mg/m ² (day1),☑ 1ヶ-21日	【CDDP腎機能別投与量の目安】☑ Ccr60以上:100%,40-60:75%,30-45:50%,30以下:中止	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》 DOC+RT(耳・13)	7	-	【併用薬】グラネトロン内服ゼリー,☑ DOC:10mg/m ² (day1.8.15.22.29.36),☑ 1ヶ-42日	【要処方】グラネトロン内服ゼリー	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》 S1+CDDP少量(動注)【閉鎖 式器具使用不可】	7	-	閉鎖式器具使用不可,☑ 【S1】80mg/body経口投与,メロ: CDDP10mgに対して1mL混注,☑ day1-5を1ヶ-として4ヶ-継続,(20回),☑ CDDP:6.5-8.5mg/m ² (day1-5),☑ 1ヶ-7日	【要処方】S1	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》 DCF(動 注)(DOC/CDDP/5FU)【7日 イマド】	28	-	DOC,CDDPは閉鎖式器具使用不可,☑ デトキ: CDDP投与前より140mL/hで開始,帰宅後35mL/hに変更,メロ: CDDP10mgに対して 1mL,リソ:抗癌剤投与後血管保護目的,☑ day0:Hydration,☑ DOC:50-60mg/m ² (day1),CDDP:50-60mg/m ² (day1),5FU:600-750mg/m ² (day2-6),☑ 1ヶ-28日	【要処方】day0にHydration	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》 DOC+CDDP(動注)【7日 イマド】【閉鎖式器具使用不可】	21	-	閉鎖式器具使用不可,☑ デトキ: CDDP投与前より140mL/hで開始,帰宅後35mL/hに変更,リソ:血管保護目的,メロ : CDDP10mgに対して1mL,☑ day0:Hydration,☑ DOC:50-60mg/m ² (day1),CDDP:50-60mg/m ² (day1),☑ 1ヶ-21日	【要処方】day0にHydration	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》 CDDP少量	7	-	術前治療:15回,化学療法+放射線治療のみ:25-35回,☑ CDDP:5-10mg/body(day1-5),☑ 1ヶ-7日		
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》新 CF(CDDP/5FU)【7日 イマド】	28	-	day0:Hydrationあり,☑ 【7日イマド】☑ CDDP:50-70mg/m ² (day1),5FU:660-750mg/m ² (day1-5),☑ 1ヶ-28日	【要処方】day0にHydration	
歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》新 TPF(DOC/CDDP/5FU)【7日 イマド】	28	-	放射線療法同時施行の場合は5FU250mg/m ² に減量,☑ day0:Hydrationあり,☑ 【7日イマド】☑ CDDP:50-70mg/m ² (day1),5FU:250-500mg/m ² (day1-5),DOC50mg/m ² (day1),☑ 1ヶ-28日	【要処方】day0にHydration	

歯科口腔外科	《口腔癌/扁平上皮癌》(共) 新weekly PTX	28	-	【7-ポイント】☑ CDDP:70mg/m ² (day1),5FU:700mg/m ² (day1-5),Cet:初回400mg/m ² ,2回目以降250mg/m ² (day1,8,15,22)☑ 17-日:21日	【要処方】レスタミン
--------	-------------------------------	----	---	---	------------