

科	分類	レジメン名称	1クール 日数	注意コメント
歯科口腔外科	頭頸部癌	《頭頸部癌》 weekly PTX(6投2休)〈外・113〉	56	デキサト:2回目を以降減量可,☒ PTX:100mg/㎡(day1.8.15.22.29.36),☒ 1クール:56日
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》☆FP+Cet(Cetのみ)〈耳・23〉	7	CDDP:70mg/㎡(day1),5FU:700mg/㎡(day1-5),Cet:初回400mg/㎡,2回目を以降250mg/㎡(day1.8.15.22)☒ 1クール:7日
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》FP(5FU/CDDP)+Cet【ブライマド】(継続)day1のみ	21	【ブライマド】,☒ CDDP:70mg/㎡(day1),5FU:700mg/㎡(day1-5),Cet:初回400mg/㎡,2回目を以降250mg/㎡(day1.8.15.22),☒ 1クール:21日
歯科口腔外科	頭頸部癌	《頭頸部癌》(4週毎)Nivolumab480mg/body	28	infusion reactionを認めた場合,次回より前投薬としてアトアミ/アムニ/アムニ/アムニの追加を考慮する,体重30kg未満の場合,生食の希釈液100mLから50mLを抜いて対応すること,☒ Nivolumab:480mg/body(day1),☒ 1クール:28日
歯科口腔外科	頭頸部癌	《頭頸部癌》PTX+CBDC+ Cet(初回)	21	CBDC(mg/body)=AUC(mg/ml/min)×(GFR+25),Calvert:GFR=Ccrと仮定,☒ PTX:100mg/㎡(day1.8),CBDC:AUC2.5(day1.8),Cet:初回400mg/㎡,2回目を以降250mg/㎡(day1.8.15),☒ 1クール:21日
歯科口腔外科	頭頸部癌	《頭頸部癌》PTX+CBDC+ Cet(継続)	21	CBDC(mg/body)=AUC(mg/ml/min)×(GFR+25),Calvert:GFR=Ccrと仮定,☒ PTX:100mg/㎡(day1.8),CBDC:AUC2.5(day1.8),Cet:初回400mg/㎡,2回目を以降250mg/㎡(day1.8.15),☒ 1クール:21日
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》wPTX+Cet(継続)〈耳・24〉	7	Cet:初回400mg/㎡,2回目を以降250mg/㎡(day1.8.15.22.29.36.43.50),☒ PTX:80mg/㎡(day1.8.15.22.29.36),☒ 1クール:56日☒ *day43.50:wPTX+Cet(Cetのみ)を適用
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》wPTX+Cet(初回)〈耳・24〉	7	Cet:初回400mg/㎡,2回目を以降250mg/㎡(day1.8.15.22.29.36.43.50),☒ PTX:80mg/㎡(day1.8.15.22.29.36),☒ 1クール:56日☒ *day43.50:wPTX+Cet(Cetのみ)を適用
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》wPTX+Cet(Cetのみ)〈耳・24〉	7	Cet:初回400mg/㎡,2回目を以降250mg/㎡(day1.8.15.22.29.36.43.50),☒ PTX:80mg/㎡(day1.8.15.22.29.36),☒ 1クール:56日☒ *day43.50:wPTX+Cet(Cetのみ)を適用
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》FP(5FU/CDDP)+Cet【ブライマド】(初回)day1のみ	21	【ブライマド】,☒ CDDP:70mg/㎡(day1),5FU:700mg/㎡(day1-5),Cet:初回400mg/㎡,2回目を以降250mg/㎡(day1.8.15.22),☒ 1クール:21日
歯科口腔外科	頭頸部癌	《頭頸部癌》(2週毎)Nivolumab240mg/body	14	infusion reactionを認めた場合,次回より前投薬としてアトアミ/アムニ/アムニ/アムニの追加を考慮する,☒ 体重30kg未満の場合,生食の希釈液を50mLに変更する,☒ Nivolumab:240mg/body(day1),☒ 1クール:14日
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》TPF(DOC/CDDP/5FU)【ブライマド】	28	放射線療法同時施行の場合は5FU:250mg/㎡に減量,☒ day0:Hydrationあり,☒ 【ブライマド】,☒ CDDP:50-70mg/㎡(day1),5FU:250-500mg/㎡(day1-5),DOC:50mg/㎡(day1),☒ 1クール:28日
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》(共)weekly PTX	28	【イスタミン】10mg5T(day1.8.15),*経口不能時:ボラフィン1A,☒ デキサト:2回目を以降減量可,☒ PTX:80mg/㎡(day1.8.15),☒ 1クール:28日
歯科口腔外科	頭頸部扁平上皮癌	《頭頸部扁平上皮癌》CBDC+RT〈耳・11〉	7	CBDC:75mg/㎡(day1),☒ 1クール:7日
歯科口腔外科	悪性黒色腫	《悪性黒色腫》DAV(DTIC/ACNU/VCR)【ブレイタト】〈形・2〉	21	【ブレイタト】125mg(day1),80mg(day2-5),☒ DTIC:80-140mg/㎡(day1-5),ACNU:50-80mg/㎡(day1),VCR:0.5-0.8mg/㎡(MAX2mg/body)(day1),☒ 1クール:21日
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》CDDP超選択的動注〈耳・18〉【閉鎖式器具使用不可】	7	【ブレイタト】125mg(day1),80mg(day2.3),【ブレイタト】8mg(day2.3),☒ メロ: CDDP10mgに対し1mL,デト: CDDPと同時に9A,終了後に6hrで9A,☒ RT併用又は単独,2クール目は1W後以降(RT中に3.4回),リド:カイン:血管痛・スル:ス予防,リド:血管保護目的,☒ CDDP:100mg/㎡(day1),☒ 1クール:7日
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》CF(CDDP/5FU)【ブライマド】	28	day0:Hydrationあり,☒ 【ブライマド】,☒ CDDP:50-70mg/㎡(day1),5FU:750mg/㎡(day1-5),☒ 1クール:28日
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》DOC+RT〈耳・13〉	7	【併用薬】ゲラセロ内服ゼリー,☒ DOC:10mg/㎡(day1.8.15.22.29.36),☒ 1クール:42日
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》wDOC+Cet(継続)〈耳・22〉	28	【イスタミン】10mg5T(day1),*経口不能時:ボラフィン1A,☒ DOC:20mg/㎡(day1.8.15),Cet:初回400mg/㎡,2回目を以降250mg/㎡(day1.8.15.22),☒ 1クール:28日
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》CF(CDDP/5FU)+RT【ブライマド】〈耳・9〉	21	【ブライマド】,☒ day0:Hydration,☒ CDDP:40mg/㎡(day1),5FU:400mg/㎡(day1-5),☒ 1クール:21日
歯科口腔外科	頭頸部癌	《頭頸部癌》(3週毎)Pembrolizumab200mg/body	21	Pembrolizumab:200mg/body(day1),☒ 1クール:21日,☒ infusion reaction G2:投与中止,1hr以内に回復の場合,投与速度50%減速して再開,☒ infusion reaction経験例は次回より前投薬投与(イスタミン50mg,アトアミ/アムニ/アムニ/アムニ500-1000mg)
歯科口腔外科	頭頸部癌	《頭頸部癌》(6週毎)Pembrolizumab400mg/body	42	Pembrolizumab:400mg/body(day1),☒ 1クール:42日,☒ infusion reaction G2:投与中止,1hr以内に回復の場合,投与速度50%減速して再開,☒ infusion reaction経験例は次回より前投薬投与(イスタミン50mg,アトアミ/アムニ/アムニ/アムニ500-1000mg)
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》CDDP+RT【ブライマド】	21	CDDP:80-100mg/㎡(day1),☒ 1クール:21日
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》Cet(初回)〈外・309〉	7	【イスタミン】10mg5T(day1),*経口不能時:ボラフィン1A,☒ デキサト:初回6.6mg,2回目を以降3.3mg,☒ Cet:初回400mg/㎡,2回目を以降250mg/㎡,☒ 1クール:7日
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》Cet(継続)〈外・309〉	7	【イスタミン】10mg5T(day1),*経口不能時:ボラフィン1A,☒ デキサト:初回6.6mg,2回目を以降3.3mg,☒ Cet:初回400mg/㎡,2回目を以降250mg/㎡,☒ 1クール:7日
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》S1+CDDP少量(動注)【閉鎖式器具使用不可】	7	閉鎖式器具使用不可,☒ 【S1】80mg/body経口投与,メロ:CDDP10mgに対して1mL混注,☒ day1-5を1クールとして4クール継続,(20回),☒ CDDP:6.5-8.5mg/㎡(day1-5),☒ 1クール:7日

歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》DOC+CDDP(動注)【7日投与】 【閉鎖式器具使用不可】	21 閉鎖式器具使用不可,☑ デトキソールCDDP投与前より140mL/hで開始,帰宅後35mL/hに変更,リネポン:血管保護目的,メイワ:CDDP10mgに対して1mL,☑ day0:Hydration,☑ DOC:50-60mg/m ² (day1),CDDP:50-60mg/m ² (day1),☑ 1クール:21日
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》DCF(動注)(DOC/CDDP/5FU)【7日投与】	28 DOC,CDDPは閉鎖式器具使用不可,☑ デトキソールCDDP投与前より140mL/hで開始,帰宅後35mL/hに変更,メイワ:CDDP10mgに対して1mL,リネポン:抗癌剤投与後血管保護目的,☑ day0:Hydration,☑ DOC:50-60mg/m ² (day1),CDDP:50-60mg/m ² (day1),5FU:600-750mg/m ² (day2-6),☑ 1クール:28日
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》wDOC+Cet(初回)〈耳・22〉	28 【イスタミン】10mg5T(day1),*経口不能時ポララミン1A,☑ DOC:20mg/m ² (day1.8.15),Cet:初回400mg/m ² ,2回目以降250mg/m ² (day1.8.15.22),☑ 1クール:28日
歯科口腔外科	口腔癌/扁平上皮癌	《口腔癌/扁平上皮癌》CDDP少量	7 術前治療:15回,化学療法+放射線治療のみ:25-35回,☑ CDDP:5-10mg/body(day1-5),☑ 1クール:7日